Mode d'emploi du médicament DRILL ALLERGIE

Dans quel cas le médicament DRILL ALLERGIE est-il prescrit ?

Ce médicament est un antihistaminique antiallergique. Contrairement aux antihistaminiques plus anciens, il n'a pas d'effets atropiniques ni, dans la majorité des cas, d'effet sédatif.
Il est utilisé dans le traitement de différentes manifestations
allergiques : rhiniteou conjonctivite allergiques, urticaire.

Présentations du médicament DRILL ALLERGIE

DRILL ALLERGIE : comprimé à sucer (arôme pomme) ; boîte de 7

Composition du médicament DRILL ALLERGIE

	p cp
Cétirizine dichlorhydrate	10 mg

Substance active : Cétirizine dichlorhydrate
Excipients : Bétadex, Cellulose microcristalline, Cellulose poudre, Citrate monosodique, Glucose, Magnésium stéarate, Maltodextrine, Pomme arôme, Povidone, Sodium cyclamate

Contre-indications du médicament DRILL ALLERGIE

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale grave.
Attention
Ce médicament est en vente libre. En l'absence d'avis médical, il ne doit toutefois être utilisé que chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans, en cas de réapparition de symptômes déjà diagnostiqués par un médecin et traités auparavant par un médicament contenant la même substance (cétirizine).
Des précautions sont nécessaires en cas d'épilepsie ou d'antécédent deconvulsions.
Bien qu'aucune interaction nette n'ait été constatée avec l'alcool, évitez la prise de boissons alcoolisées pendant le traitement.

Ce médicament peut, dans de rares cas, entraîner une baisse de la vigilance. Assurez-vous à l'occasion des premières prises que vous le supportez bien, avant de conduire ou d'utiliser une machine dangereuse.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :
L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.
Allaitement :
Ce médicament passe faiblement dans le lait maternel. Il est cependant préférable de ne pas l'utiliser sans avis médical pendant l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament DRILL ALLERGIE

Les comprimés doivent être sucés ou dissous dans un peu d'eau.
Posologie usuelle :

- Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 comprimé par jour.

En cas d'insuffisance rénale, une adaptation des doses peut être nécessaire.

Conseils

La cétirizine agit sur les manifestations de l'allergie mais n'en supprime pas la cause. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Effets indésirables possibles du médicament DRILL ALLERGIE

Somnolence, fatigue, vertiges, maux de tête et plus rarement, sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation.

D'autres effets indésirables ont également été observés :

- peu fréquemment : nausées, diarrhée, agitation, fourmillement des extrémités, éruption cutanée ;
- rarement : convulsions, confusion, tachycardie, augmentation destransaminases ;
- très rarement : tremblements, altération du goût, œdème de Quincke, diminution du nombre des plaquettes sanguines.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.